

**ПРИВИВКА –
доступная и бесплатная
защита от коронавирусной
инфекции.**
**Вакцинация позволяет
предупредить тяжелые
формы заболевания
и избежать осложнений.**
**Заразиться коронавирусной
инфекцией
непосредственно от вакцин
невозможно.**



www.profilaktica.ru

ВАКЦИНАЦИЯ против коронавирусной инфекции

	Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»)	«ЭпиВакКорона»	КовиВак
Вводится	Двукратно, с интервалом 3 недели	Двукратно, с интервалом 2-3 недели	Двукратно, с интервалом 2 недели
Устойчивый иммунитет	Формируется через 21 день после второй вакцинации	Формируется через 30 дней после второй вакцинации	Формируется через 14 дней после второй вакцинации

**Возможные побочные явления:
кратковременное повышение температуры, головная боль,
слабость, аллергические реакции.**

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ



Тщательно мойте руки с мылом и водой после посещения общественных мест, пользования транспортом, возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми



Исключите при приветствии тесные объятия и рукопожатия, в особенности с людьми, которые кашляют и чихают



Используйте антибактериальные салфетки или дезинфицирующий гель для рук



Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа



Не касайтесь глаз, носа или рта руками



Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь